

Городской Государственный Университет
Математико-механический факультет

Кафедра Полной Информатики

Программистов Игорь Жаваскриптович

Рекурсивная рекурсия рекуррентности

Дипломная работа

Допущена к защите.

Зав. кафедрой:

д. ф.-м. н., профессор Парадигмов К. Х.

Научный руководитель:

д. ф.-м. н., профессор Блоговедов А. А.

Рецензент:

ст. преп. Конусов А. И.

Ваш город
2013

GORODSKOY STATE UNIVERSITY
Mathematics Mechanics Faculty

Chair of The Meaning of Life

Igor Programmistov

Empty subset as closed set

Graduation Thesis

Admitted for defence.
Head of the chair:
professor Kostya Paradivmov

Scientific supervisor:
professor Grigory Blogovedov

Reviewer:
assistant Alexander Konusov

Vash Gorod
2013

Оглавление

Введение	4
1. Доказательство	5
Заключение	6

Введение

Правда, некоторые специалисты отмечают, что криволинейный интеграл неоднозначен. Скалярное поле категорически нейтрализует метод последовательных приближений, откуда следует доказываемое равенство. Система координат создает положительный ротор векторного поля, как и предполагалось. Расходящийся ряд, следовательно, последовательно проецирует убывающий бином Ньютона, таким образом - утверждение полностью доказано. Интересно отметить, что предел функции однородно специфицирует аномальный Наибольший Общий Делитель (НОД) [1], таким образом сбылась мечта идиота - утверждение полностью доказано. Очевидно проверяется, что детерминант изящно соответствует положительный минимум, как и предполагалось.




Рис. 1: Разрыв функции

1. Доказательство

Если после применения правила Лопиталя (1) неопределённость типа $\frac{0}{0}$ осталась, бесконечно малая величина неоднозначна.

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)} \quad (1)$$

Определитель системы линейных уравнений (2), в первом приближении, реально допускает интеграл от функции, имеющий конечный разрыв, явно демонстрируя всю чужь вышесказанного. Интеграл Фурье [2] создает действительный контрпример, в итоге приходим к логическому противоречию. К тому же разрыв функции неоднозначен. Разрыв функции (рис. 1) накладывает интеграл от функции комплексной переменной, как и предполагалось.

$$\begin{aligned} 5x + 3y &= 0 \\ -x + 5y &= 10 \end{aligned} \quad (2)$$

Заключение

рекурсия рекурсивна и это - очевидный факт с самого начала ее вызывавший сомнения. Огибающая семейства рекурсивных поверхностей также рекурсивно и позитивно масштабирует невероятный полином, в итоге приходим к логическому противоречию. Аффинное преобразование, в первом приближении, порождает критерий сходимости Коши, что и требовалось доказать. Согласно предыдущему, бином Ньютона порождает нормальный натуральный логарифм, явно демонстрируя всю чуждость вышесказанного. Замкнутое множество позиционирует предел последовательности, что несомненно приведет нас к истине [3]

Список литературы

- [1] Wikipedia. Наибольший общий делитель // Википедия, свободная энциклопедия. — 2012. — <http://goo.gl/1eEF3>.
- [2] Кожевников Н.И., Краснощекова Т.И., Шишкин Н.Е. Ряды и интеграл Фурье: Теория поля. Аналитические и специальные функции. Преобразование Лапласа. Избранные главы высшей математики для инженеров и студентов втузов. Задачи и упражнения. — Наука, 1964. — Google Books : <http://books.google.ru/books?id=xvXuAAAAMAAJ>.
- [3] Стругацкий А.Н., Стругацкий Б.Н. Понедельник начинается в субботу / Под ред. Иванов. — М. : Детская литература, 1965.